

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful



Copyright disclaimer

"La faculté" is a website that collects medical documents written by Algerian assistant professors, professors or any other health practicals and teachers from the same field.

Some articles are subject to the author's copyrights.

Our team does not own copyrights for some content we publish.

"La faculté" team tries to get a permission to publish any content; however , we are not able to contact all authors.

If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on: facadm16@gmail.com to settle the situation.

All users must know that "La faculté" team cannot be responsible anyway of any violation of the authors' copyrights.

Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up.



$$1/ \underset{n_1}{O} \xrightarrow{H} \underset{n_2}{O'} \xrightarrow{R} \underset{n_1}{O''}$$

$$\frac{HO}{n_1} = \frac{HO'}{n_2} \rightarrow n_1 = \frac{HO}{HO'} \cdot n_2$$



$$n_1 = \frac{40}{20} \cdot 24 \rightarrow n_1 = 4,8$$

$$2/ \operatorname{tg} d = \frac{R}{h} \rightarrow R = h \operatorname{tg} d$$

$$\sin d = \frac{1}{2} \quad \sin d = \frac{1}{2} \rightarrow d = 30^\circ$$

$$R = 10 \times \operatorname{tg} 30^\circ$$

$$R = 5,77 \text{ cm}$$



$$3/ i = 90^\circ \rightarrow r = d$$

$$\sin d = \frac{1}{2} \quad \sin d = \frac{1}{1,5} \rightarrow d = 41,8^\circ$$

$$A = r + r' \rightarrow r' = A - d \quad r' = 18,2^\circ$$

$$n \sin r = n_0 \sin i_0$$

$$\sin i_0 = \frac{n \sin r'}{n_0}$$


$$\sin i_0 = \frac{1,5 \sin 18,2^\circ}{1} \quad i_0 = 27,9^\circ$$

ou bien directement puisque $i = 90^\circ$ donc $i' = i_0$ avec

$$n_0 \sin i_0 = n \sin (A - d)$$

$$\sin i_0 = \frac{n}{n_0} \sin (A - d)$$

$$\sin i_0 = \frac{1,5}{1} \sin (60 - 41,8^\circ) \rightarrow i_0 = 41,9^\circ$$



1/ Puisque le rayon à pénétrer le prisme, il se trouve, dans le milieu le moins réfringent donc il émergera \rightarrow (d)


2/ $R_1 > 0$ $R_2 > 0$ avec $R_1 > R_2$

$$C = \frac{1}{OF'} = \left(\frac{n}{n_0} - 1\right) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$$

$$OF' = -40 \text{ cm (Lentille DV)}$$

$$-\frac{1}{40} = \left(\frac{1.5}{1} - 1\right) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{10}\right)$$

$$R_1 = 20 \text{ cm}$$



3/ $OV \rightarrow OA > 0$
 $IV \rightarrow OA' < 0$ $\} \rightarrow \gamma < 0$

2 fois plus grande $\Rightarrow |A'B'| = 2|AB|$

$$\rightarrow \frac{|A'B'|}{|AB|} = 2 \rightarrow |\gamma| = 2 \rightarrow \gamma = -2$$


$$\gamma = \frac{OA'}{OA} \quad OA = 12 \text{ cm} \rightarrow OA' = -24 \text{ cm}$$

$$\frac{1}{OF'} = \frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA} \quad \frac{1}{OF'} = \frac{1}{-24} - \frac{1}{12} \rightarrow OF' = -8 \text{ cm}$$

4/

$A'B'$ image réelle

\rightarrow (d)



8/ $A = 45$ ocul normal $OPR = -\infty$

$$A = \frac{1}{OPR} - \frac{1}{OPD} \rightarrow OPR = -0,25^m$$

9/ $C_{max} = \frac{1}{OT} - \frac{1}{OPD}$ (avec $OT = 17mm$)

$$\frac{1}{OPD} = \frac{1}{OT} - C_{max} \quad \frac{1}{OPD} = \frac{1}{17 \times 10^{-3}} - 64,7 \rightarrow OPR = -17^m$$

10/ $C = 15$ $OPR_c = -\infty$

$$C = \frac{1}{OPR} - \frac{1}{OPD} \rightarrow OPR = -\frac{1}{C} \rightarrow OPR =$$

$$C = \frac{1}{OPR} - \frac{1}{OPR_c} \quad OPR = \frac{1}{C} \rightarrow OPR = +1m$$


11/ $A = 15$ la presbytie n'affecte pas le PR
 $\rightarrow OPR$ ne change pas. $\rightarrow \textcircled{C}$

12/ le PR s'éloigne, A varie $\rightarrow \textcircled{a}$

13/

Il s'agit d'une loupe

$A'B' =$ Image virtuelle
 $\rightarrow \textcircled{a}$



14/ $i = 60^\circ$

$$\sin d = \frac{n_1}{n_2} \quad \sin d = \frac{1,5}{3,15} \quad d = 25,37^\circ$$

$i = 60^\circ > d = 25,37 \rightarrow$ reflexion totale

$\rightarrow \textcircled{C}$


15/ $A = 25$ $A = \frac{1}{OPR} - \frac{1}{OPL}$ $OPR = -25 \text{ cm}$
 $\rightarrow OPR = -0,5 \text{ m} \rightarrow \text{myope}$

16/ \Rightarrow CV à bords minces $\rightarrow \textcircled{C}$

17/ ne subit aucune déviation $\rightarrow \textcircled{B}$


18/ voir page

19/ $A'B'$ image réelle
 $\rightarrow \textcircled{B}$ droite




20/ lentille qui corrige la myope \rightarrow divergente

$A'B'$ est virtuelle et
 droite $\rightarrow \textcircled{A}$



21/

Image virtuelle
 et inversée
 $\rightarrow \textcircled{C}$



22/ $e = \left(\frac{n}{n_0} - 1\right) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$

il faut changer le milieu tel que
 l'indice n_0 du milieu soit supérieur
 à celui de la lentille n .

23/ oeil emmetrope $OPR = -\infty$ $OP = -25 \text{ cm}$

œil sur $F_2' \rightarrow a = 0$ $O_1A = -1,5 \text{ cm}$


l'œil accommodé $\rightarrow A'B'$ à l'infini

$$O_2F_2' = 4 \text{ cm} \quad G.C = 120$$

$$|A_1B_1| = 4|AB| \rightarrow \frac{|A_1B_1|}{|AB|} = 4 \rightarrow |\gamma_1| = 4$$

pour le microscope $\rightarrow \gamma_1 = -4$

$$O_1O_2 = ?$$



Comme $A'B'$ est à l'infini, donc A_1B_1 est sur F_2

$$AB \rightarrow A_1B_1$$

$$A \xrightarrow[O_1F_1']{O_1} A_1 \quad \gamma_1 = \frac{O_1A_1}{O_1A} \rightarrow O_1A_1 = \gamma_1 \cdot OA$$

$$O_1A_1 = (-4)(-1,5) \rightarrow O_1A_1 = 6 \text{ cm}$$

$$O_1O_2 = O_1A_1 + |O_2F_2|$$

$$O_1O_2 = 6 + 4 \rightarrow O_1O_2 = 10 \text{ cm}$$


24/ oeil accommodé au maximum, donc

l'image $A'B'$ est au PR à 25 cm

de l'œil

$$25 \text{ cm} = \frac{O_2A'B'}{O_2F_2'} = \frac{O_2A'B'}{4 \text{ cm}} \rightarrow O_2A'B' = 100 \text{ cm}$$

Devoir 24/



$$AB \xrightarrow{O_1} A_1B_1 \xrightarrow{O_2} A'B' \\ (O_2) \\ (-25 \text{ cm})$$

$$A_1B_1 \rightarrow A'B'$$

$$A_1 \xrightarrow{O_2} A' \quad \frac{1}{O_2A'} = \frac{1}{O_2A_1} = \frac{1}{O_2F_2}$$

$$\frac{1}{O_2A_1} = \frac{1}{O_2A'} - \frac{1}{O_2F_2'} \quad \frac{1}{O_2A_1} = \frac{1}{-21} - \frac{1}{4} \quad O_2A' = -3,36 \text{ cm}$$

$$AB \rightarrow A_1B_1$$

$$A \xrightarrow{O_1} A_1 \quad \frac{1}{O_1A_1} - \frac{1}{O_1A} = \frac{1}{O_1F_1'} \quad O_1A_1 = 10 - 3,36 \\ O_1A_1 = 6,64 \text{ cm}$$

$$\frac{1}{O_1A} = \frac{1}{O_1A_1} - \frac{1}{O_1F_1'} \rightarrow \frac{1}{O_1A} = \frac{1}{6,64} - \frac{1}{O_1F_1'}$$

Calcul de O_1F_1'

$$G_1 = \frac{A_1O_1}{A_1O} \rightarrow G_1 = \frac{4,64}{\Delta}$$

dans la question 23 on a $O_1A_1 = 6 \text{ cm}$ $O_1A = -1,5 \text{ cm}$

$$\frac{1}{O_1F_1'} = \frac{1}{O_1A_1} - \frac{1}{O_1A} \rightarrow \frac{1}{O_1F_1'} = \frac{1}{6} - \frac{1}{-1,5} \quad O_1F_1' = 1,2 \text{ cm}$$

$$\frac{1}{O_1A} = \frac{1}{6,64} - \frac{1}{1,2} \rightarrow O_1A = -1,4644 \text{ cm}$$

6

$$25/ \quad 2 = 10,4 / 2 - 10,4 / 2$$

$$2 = 1 - 1,51 - 1 - 1,4641$$

$$L = 0,0353 \text{ cm}$$

$$26/ \quad OPR = +1 \text{ m} \quad A = 45$$

$$A = \frac{1}{OPR} - \frac{1}{OPL} \rightarrow OPL = -33 \text{ cm}$$

donc 33 cm² avant de l'œil

$$27/ \quad C = \frac{1}{OPR} - \frac{1}{OPR_c} \quad OPR_c = -\infty$$

$$C = \frac{1}{OPR} \quad OPR = \frac{1}{C} \quad C = 18$$


$$C = \frac{1}{OPL} - \frac{1}{OPL_c} \rightarrow OPL_c = -25 \text{ cm}$$

champ corrigé $]-\infty, -25 \text{ cm}]$

28/

$$C = \frac{1}{O_1PR} - \frac{1}{O_1PR_c}$$

$$C = \frac{1}{10210^{-2}} \quad C = 0,988$$



$$C = \frac{1}{O_1PL} - \frac{1}{O_1PL_c} \rightarrow \frac{1}{O_1PL_c} = \frac{1}{O_1PL} - C$$

$$\frac{1}{O_1PL_c} = \frac{1}{-0,31} - 0,98 \rightarrow O_1PL_c = -0,24 \text{ m}$$

29/ AB réelle et $A'B'$ réelle donc lentille CV of $f = 4$ cm
 $OA' = +20 \text{ cm}$

$$\frac{1}{OF'} = \frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA} \rightarrow OA = -5 \text{ cm}$$

$$\gamma = \frac{OA'}{OA} \quad \gamma = \frac{20}{-5} \quad \gamma = -4 \quad |A'B'| = |\gamma| |AB|$$


$\rightarrow |A'B'| = 8 \text{ cm}$

7

$$29/ C = \left(\frac{2}{10} - 1\right) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) \quad R_1 = -R_2$$

$$\frac{1}{OF'} = \left(\frac{2}{10} - 1\right) \left(\frac{2}{R_1}\right)$$

$$\rightarrow R = 2,5 \rightarrow \textcircled{C}$$



$$R_1 > 0$$

$$R_2 < 0$$

$$R_1 = -R_2$$

$$30/ |AB| = 0,2 \text{ mm} \quad A'B' \text{ à l'infini donc}$$

$$AB \text{ est sur } F \rightarrow OA = -4 \text{ cm. (Car } OF \leq 4 \text{ cm)}$$

$$31/ P = C \left(1 - \frac{a}{d}\right) \quad d \equiv \infty \quad P = C = \frac{1}{0,04} \quad P = 25\delta$$

$$32/ G_C = \frac{e}{4} \quad G_C = \frac{25}{4} \rightarrow G_C = 6,25$$

$$33/ \text{objet virtuel} \rightarrow OA < 0 \quad \left. \begin{array}{l} \text{Image réelle} \rightarrow OA' > 0 \end{array} \right\} \rightarrow \gamma > 0$$

$$|A'B'| = 2|AB| \rightarrow |\gamma| = 2 \rightarrow \gamma = +2$$

$$\gamma = \frac{OA'}{OA} \quad OA' = 2 \cdot OA$$

$$\frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA} = \frac{1}{OF'} \rightarrow \frac{1}{2(OA)} - \frac{1}{OA} = \frac{1}{OF'}$$

$$OF' = -2(OA)$$


$$34/ \text{objet réel} \rightarrow OA > 0 \quad \left. \begin{array}{l} \text{Image virtuelle} \rightarrow OA' < 0 \end{array} \right\} \rightarrow \gamma < 0$$

$$|A'B'| = |AB| \rightarrow |\gamma| = 1 \rightarrow \gamma = -1$$

$$\frac{1}{OF'} = \frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA} \quad OA' = -OA$$

$$\frac{1}{OF'} = \frac{1}{-OA} - \frac{1}{OA} \rightarrow OF' = -\frac{OA}{2}$$

35/ oeil normal $\rightarrow OPR \equiv -\infty$



$$P = |\delta_{ob}| \cdot P_{oc} \quad \delta_{ob} = \frac{o_1 A'}{o_1 A} \quad P_{oc} = C_{oc} \left[1 - \frac{a}{d} \right]$$

$$a = 0 \rightarrow P_{oc} = C_{oc} \quad P_{oc} = \frac{1}{0.2 f_2} \quad P_{oc} = \frac{1}{0.04} \quad P_{oc} = 25 \times$$

$$AB \xrightarrow{\text{obj}} A'B' \xrightarrow{\text{oc}} A''B''$$

$$AB \xrightarrow{\text{obj}} A'B'$$

$$A \xrightarrow[o_1 f_1]{o_1} A' \quad \frac{1}{o_1 A'} - \frac{1}{o_1 A} = \frac{1}{o_1 f_1}$$

$$\frac{1}{o_1 A'} - \frac{1}{-1.05} = \frac{1}{1} \rightarrow o_1 A' = +21 \text{ cm.}$$

$$\delta_1 = \frac{o_1 A'}{o_1 A} \quad \delta_1 = \frac{21}{-1.05} \quad \delta_1 = -20$$

$$P = |\delta_{ob}| \cdot P_{oc} \quad P = |-20| \cdot 25 \quad P = 500 \times$$

36/ $G = P \times 1022'$

$$G = 500 \times 1022'$$

o2 cherche o2

$$A'B' \xrightarrow{\text{oc}} A''B''$$

$$A' \xrightarrow[o_2 f_2]{o_2} A'' \quad \frac{1}{o_2 A''} - \frac{1}{o_2 A'} = \frac{1}{o_2 f_2}$$

$$\frac{1}{o_2 A''} - \frac{1}{-3} = \frac{1}{4} \rightarrow o_2 A'' = -12 \text{ cm}$$

9

Exercice 36

$$|OA''| = 12 + 4 \quad \text{et} \quad A'' = 16 \text{ cm}$$

$$O_{22} = -16 \text{ cm}$$

$$G = L \times |O_{22}| \quad G = 500 \times |O_{22}| \quad G = 80$$

$$37/ \quad P = \frac{10^{-2}}{|AB|} \quad P = \frac{E}{|AB| \times n_c}$$


$$|AB|_{\text{meu}} = \frac{E}{P} \quad |AB|_{\text{meu}} = \frac{0,0003}{500} \quad |AB|_{\text{meu}} = 6 \cdot 10^{-5}$$

$$|AB|_{\text{meu}} = 0,6 \mu$$

$$38/ \quad LL = |O_1 A|_{p2} - |O_1 A|_{22}$$

$$|O_1 A|_{22} = 1,05 \text{ cm}$$

on cherche $|O_1 A|_{p2}$ c'est la position de l'objet
telque l'image $A''B''$ soit au 22



$$AB \xrightarrow{O_1} A'B' \xrightarrow{O_2} A''B'' \quad (O_{22} = -\infty)$$

$$A''B'' \text{ à l'infini} \rightarrow A'B' \text{ sur } F_2$$


$$AB \xrightarrow{O_1} A'B'$$

$$A \xrightarrow[O_1 F_1]{O_1} A' \quad \frac{1}{O_1 A'} - \frac{1}{O_1 A} = \frac{1}{O_1 F_1}$$

$$\frac{1}{O_1 A} = \frac{1}{O_1 A'} - \frac{1}{O_1 F_1} \rightarrow \frac{1}{O_1 A} = \frac{1}{20} - \frac{1}{1} \quad O_1 A = -1,05$$

$$LL = |-1,0526| - |-1,05| \quad LL = 0,0026 \text{ cm}$$

Ex 18/




$$R_1 > 0$$

$$R_2 > 0$$

avec $R_2 > R_1$

$$C = \left(\frac{3,2}{1,6} - 1 \right) \left(\frac{1}{0,3} - \frac{1}{0,45} \right) \Rightarrow \begin{cases} R_1 = 0,3 \text{ m} \\ R_2 = 0,45 \text{ m} \end{cases}$$


39/



$$L' = \frac{A'B'}{OA'}$$

au fur et à mesure α' et faut diminuer OA'
donc l'observateur doit se rapprocher.

46/



pour voir son image sans accommodation,
le miroir doit se situer sur le Pk
et on sait que P et O' sont symétriques
par rapport au miroir : $|MO'| = |MO|$

$$\Rightarrow 2|MO| = 1,5 \text{ m} \Rightarrow MO = 75 \text{ cm}$$

M

$$40/ P = c \left[1 - \frac{a}{d} \right] \quad a=0 \quad P=c$$

donc la puissance est égale à c
quelle que soit la position de l'objet

$$41/]OPR_c, OPR_c] =]-\infty, -20 \text{ cm}]$$

$$c = -2,5 \quad c < 0 \rightarrow \text{myope}$$

$$42/ c = \frac{1}{OPR} - \frac{1}{OPR_c} \quad OPR = \frac{1}{c}$$


$$OPR = -0,4 \text{ m.}$$

$$43/ c = \frac{1}{OPR} - \frac{1}{OPR_c} \rightarrow \frac{1}{OPR_c} = c + \frac{1}{OPR}$$

$$\frac{1}{OPR_c} = -2,5 + \frac{1}{-0,4} \rightarrow OPR_c = -0,133 \text{ m}$$

$$44/ A = \frac{1}{OPR} - \frac{1}{OPR_c} \quad \text{ou bien } A = \frac{1}{OPR_c} - \frac{1}{OPR_c}$$


$$A = \frac{1}{-0,4} - \frac{1}{-0,133} \quad A = 58$$



$$c = \left(\frac{n}{n_0} - 1 \right) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

$$\rightarrow R_1 = 162 \text{ mm}$$

47/ $C_{ab} = 200 \text{ } \delta$ $\frac{1}{f_1} = \frac{1}{200}$ $0, F_1 = 5 \text{ mm}$ I
 O $0, F'_2 = 2 \text{ cm}$



$$P = \Delta \cdot C_{ab} \cdot C_{oc}$$

4"8" à l'infini

$$\frac{1}{0, A'} - \frac{1}{0, A} = \frac{1}{0, F_1}$$

$$\frac{1}{0, F'_2} = \frac{1}{0, F_1} + \frac{1}{0, A}$$


$$\frac{1}{0, A'} = \frac{1}{5} + \frac{1}{-5,1} \rightarrow 0, A' = 255 \text{ mm}$$

$$\Delta = 255 - 5 \quad (\Delta = 0, F_2 - 0, F'_1) \quad \Delta = 250 \text{ mm}$$

$$C_{oc} = \frac{1}{0,2 F'_2} \quad C_{oc} = \frac{1}{2 \cdot 10^{-2}} \quad C_{oc} = 50 \delta$$

$$P = \Delta \cdot C_{ab} \cdot C_{oc} \quad P = 250 \cdot 10^{-3} \cdot 200 \cdot 50 \quad P = 2500 \delta$$

13



$$A'B' \xrightarrow{O_2} A''B''$$

$$\frac{1}{O_2 F'_2} = \frac{1}{O_2 A''} - \frac{1}{O_2 A'} \rightarrow \frac{1}{O_2 F'_2} = \frac{1}{O_2 A''} - \frac{1}{O_2 A'}$$

$$\frac{1}{O_2 A'} = \frac{1}{-1,8} - \frac{1}{2} \quad O_2 A' = -1,8 \text{ cm}$$

$$\rightarrow O_1 A' = O_1 O_2 - O_2 A' = 24,5 - 1,8$$

$$AB \xrightarrow{O_1} A'B'$$

$$\frac{1}{O_1 A'} - \frac{1}{O_1 A} = \frac{1}{O_1 F'_1} \rightarrow \frac{1}{O_1 A} = \frac{1}{O_1 A'} - \frac{1}{O_1 F'_1}$$

$$\frac{1}{O_1 A} = \frac{1}{24,5} - \frac{1}{0,5} \rightarrow O_1 A = -0,509921 \text{ cm}$$

14

Acate 48

u1

$$d = |o_1 A|_{P2} - |o_1 A|_{2P}$$

$$d = |5,11| - |5,09921| \quad d = 0,00079 \text{ mm}$$

$$d = 0,79 \mu\text{m}$$

49/ Accommodation max. 4"13" au RP

$$G = L / 0,221$$

$$P = 1505 / 0,221 \quad \delta_{ob} = \frac{o_1 A'}{o_1 A} \quad \delta_{ob} = \frac{25,7}{-0,5099}$$

$$\delta_{ob} = -50,4$$

$$P_{oc} = C_{oc} \left[1 - \frac{a}{d} \right] \quad a=0 \quad P_{oc} = C_{oc} = 508$$

$$P = 1 - 50,4 / 50 \rightarrow P = 25208$$

$$G = 2520 \times 10,21 \quad G = 504.$$

$$50/ \quad G_c = A \cdot C_{ob} \cdot C_{oc} / 4$$

$$G_c = \frac{0,25 \times 200 \times 50}{4} \rightarrow G_c = \frac{2500}{4}$$

$$G_c = 625$$

$$51/ \quad P = \frac{E}{|AB|_{m12}} \rightarrow |AB|_{m12} = \frac{E}{P}$$

$$|AB|_{m12} = \frac{210^{-4}}{2520} \quad |AB|_{m12} = 1,19 \cdot 10^{-7} \text{ m}$$

1/3

$$32/ \text{OPR} = -\infty \quad \text{OIP} = -40 \text{ cm}$$

$$A = \frac{1}{\text{OPR}} - \frac{1}{\text{OIP}} \quad A = \frac{1}{\infty} - \frac{1}{-0,4} \quad A = 2,5 \delta$$

$$33/ \text{Cmax} = ? \quad \text{Cmax} = \frac{1}{\text{OT}} - \frac{1}{\text{OIP}}$$

$$\text{Cmax} = \frac{1}{1410^{-3}} - \frac{1}{-0,4} \quad \text{Cmax} = 67,32 \delta$$

$$34/ \text{myopia} \quad \text{OIP} = -5 \text{ m} \rightarrow \text{Presbytie}$$

$$35/ A = \frac{1}{\text{OPR}} - \frac{1}{\text{OIP}}$$


la puissance de l. amétrope est $P = \frac{1}{\text{OIP}}$

$$\frac{1}{\text{OPR}} = A + \frac{1}{\text{OIP}} = P \rightarrow P = 6 + \frac{1}{-5} \quad P = 5,8 \delta$$

36/

$$C = \frac{1}{\text{OIPR}} - \frac{1}{\text{OIPRc}} \quad \text{OIP} (-5 \text{ m})$$

$$\text{OIPRc} = \infty$$



$$\frac{\text{OIPR}}{(17 \text{ cm})}$$

$$\text{OIP} \quad P = \frac{1}{\text{OIPR}} \rightarrow \text{OIPR} = \frac{1}{P}$$

$$\text{OIPR} = 0,17 \text{ m} \rightarrow \text{OIPR} = 17 \text{ cm}$$


$$C = \frac{1}{\text{OIPR}} \quad C = \frac{1}{0,17} \quad C = 5,8 \delta$$

$$57/ \quad c = \frac{1}{o_1 p p_c} - \frac{1}{o_1 p p_c} \rightarrow \frac{1}{o_1 p p_c} = \frac{1}{o_1 p p_c} - c$$


$$\frac{1}{o_1 p p_c} = \frac{1}{(-4,98)} - 5,2$$

$$o_1 p p_c = (-0,118)$$

$$\rightarrow o p p_c = -20 \text{ cm.}$$



$$58/ \quad ocl \text{ sur } f' \rightarrow a = 0$$



$$R_1 > R_2 \text{ so } R_2 > R_1$$

$$\rightarrow R_2 = 4 \text{ cm}$$

$$o p p_c = -15 \text{ cm}$$

$$o p p_c = -50 \text{ cm}$$

$$c = \left(\frac{1}{r_0} - 1 \right) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \quad \text{avec } p = c \left(1 - \frac{a}{o_1} \right) = c$$

$$p = c = 12,58$$

$$\frac{1}{R_1} = \frac{c}{\left(\frac{1}{r_0} - 1 \right)} + \frac{1}{R_2} \rightarrow R_1 = 0,22 \text{ m}$$

$$R_1 = 22 \text{ cm.}$$

$$59/ \quad \Delta = (o_1 f')^2 \left[\frac{1}{o p p_c} + a - \frac{1}{o_1 p p_c} + a \right]$$

$$o_1 f' = \frac{1}{c} = \frac{1}{12,5} \rightarrow o_1 f' = 0,08 \text{ m}$$



$$\rightarrow \Delta = 2,98 \text{ cm}$$

17

$$60/ G = R \times 10^2 R_1$$

$$G = 125 \times 10,15 / G = 1,87$$

61/



$$C = \frac{1}{O_1PR} - \frac{1}{O_1PRC} \quad O_1PRC \equiv -\infty$$


$$C = \frac{1}{O_1PR} \quad C = \frac{1}{-0,48} \quad C = -2,088$$

62/

$$C = \left(\frac{1}{R_1} - 1 \right) \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1} \right)$$

$R_1 > 0$
 $R_2 > 0$
 over
 $R_1 > R_2$

$$\frac{C}{\frac{1}{R_1} - 1} = \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}$$



$$\frac{2,08}{\frac{1}{1,52} - 1} = \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \quad \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} = 4$$

$$63/ C' = \frac{1}{O_1PR} - \frac{1}{O_1PRC}$$

$$O_1PRC \equiv -\infty$$

~~over~~ →

$$C' = \frac{1}{-0,5} \quad C' = -2$$

$C' < C = -2,08 \rightarrow$ donc la vergence →

64/ Presbyte → (C)

18

$$65/ C_{ob} = 100 \text{ f} \quad C_{oc} = 20 \text{ f} \quad O_1 O_2 = 16 \text{ cm}$$

$$O_1 F_1' = 1 \text{ cm} \quad \Delta = O_1 O_2 - (O_1 F_1') - (O_2 F_2') \quad \Delta = 10 \text{ cm}$$


$$G_c = \frac{P_c}{\gamma} \quad G_c = \frac{\Delta \cdot C_{ob} \cdot C_{oc}}{\gamma} \quad G_c = \frac{9,1 \cdot 100 \cdot 20}{\gamma} \quad G_c = 50$$

$$66/ P = \Delta \cdot C_{ob} \cdot C_{oc} \quad P_1 = 200 \text{ f}$$

$$67/ \rho = \frac{\alpha'}{|AB|} \rightarrow \alpha' = \rho \times |AB| \quad \rho = \rho_c \text{ car vision sans accommodation}$$

$$\alpha' = 200 \cdot 22 \cdot 10^{-6} \rightarrow \alpha' = 44 \cdot 10^{-4} \text{ rad}$$

$$68/ C = \frac{1}{O_2 D} - \frac{1}{O_2 D_c} \rightarrow C = -2,5 \text{ f}$$



$$69/ OA < 0 \text{ car objet réel} \quad OA = -1 \text{ m}$$

$$OA' < 0 \text{ car image virtuelle}$$

$$\text{Image 2 fois plus petite} \rightarrow |A'B'| = \frac{|AB|}{2} \rightarrow |\gamma| = \frac{1}{2}$$

$$\gamma = \frac{OA'}{OA} \quad \gamma > 0 \rightarrow \gamma = +\frac{1}{2} \quad OA' = \gamma \cdot OA$$

$$OA' = \frac{1}{2} (-1) \rightarrow OA' = -0,5 \text{ m}$$

$$\frac{1}{OF'} = \frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA}$$

$$\frac{1}{OF'} = \frac{1}{-0,5} - \frac{1}{-1} \rightarrow OF' = -1 \text{ m}$$

$$C = \frac{1}{OF'} \quad C = -1 \text{ f}$$

$$70/ A = \frac{1}{OPR} - \frac{1}{OPR_c} \quad C = \frac{1}{OPR} - \frac{1}{OPR_c} \quad OPR = -1 \text{ m}$$

$$A = \frac{1}{-1} - \frac{1}{-0,4} \rightarrow A = 1,5$$

19

71/ Myope car $OPD = -0,4m$
+ besmyte

72/ $c = \frac{1}{OPD} - \frac{1}{OPD_c} \rightarrow \frac{1}{OPD_c} = \frac{1}{OPD} - c$

$OPD = -66,67cm$. $d = 66,67cm$

73/ $Cob = 50\%$ $Coe = 20\%$

$o_1 f_1 = 2cm$ $o_2 f_2 = 5cm$ $o_1 o_2 = 25cm$


$\Delta = 18cm$.

$G = 2 \times 10^{11} l$

mise au point à l'infini $\rightarrow P = P_c = \Delta G \cdot C$

$P = 0,18 \cdot 10^{12}$ $P = 180\%$

$G = 10,666 \cdot 180$ $G = 1920$




$AB \xrightarrow{O_1} A'B' \xrightarrow{O_2} A''B''$
 \downarrow
 sur F_2

$A''B''$ à l'infini $\rightarrow A'B'$ sur F_2

$AB \xrightarrow{O_1} A'B'$

$A \xrightarrow[o_1 f_1]{o_1} A'$ $\frac{1}{o_1 A'} - \frac{1}{o_1 A} = \frac{1}{o_1 f_1}$

$\frac{1}{o_1 A} = \frac{1}{o_1 A'} - \frac{1}{o_1 f_1}$ $\frac{1}{o_1 A} = \frac{1}{20} - \frac{1}{2} \rightarrow o_1 A = -2,222$
 20



$$AB \xrightarrow{O_2} A'B' \xrightarrow{O_1} A''B''$$

$$A' \xrightarrow{O_2} A'' \quad \frac{1}{O_2 A''} - \frac{1}{O_2 A'} = \frac{1}{O_2 F_2} \rightarrow \frac{1}{O_2 A'} = \frac{1}{O_2 A''} - \frac{1}{O_2 F_2}$$

$$\frac{1}{O_2 A'} = \frac{1}{-66.67} - \frac{1}{5} \rightarrow O_2 A' = -4.625 \text{ cm}$$

$$O_2 A' = 25 - 4.625 = 20.375$$

$$AB \xrightarrow{O_1} A'B'$$

$$A \xrightarrow{O_1} A' \quad \frac{1}{O_1 A'} - \frac{1}{O_1 A} = \frac{1}{O_1 F_1} \rightarrow \frac{1}{O_1 A} = \frac{1}{O_1 A'} - \frac{1}{O_1 F_1}$$

$$\frac{1}{O_1 A} = \frac{1}{20.375} - \frac{1}{2} \rightarrow O_1 A = -2.2177 \text{ cm}$$

$$L = |O_1 A|_{PR} - |O_1 A|_{RR} \quad L = |-2.2222| - |-2.2177|$$

$$L = 0.00443 \text{ cm} = 4.4 \times 10^{-6} \text{ cm}$$

76/ $P = \frac{\Sigma}{|AB|_{\text{mca}}}$

$$|AB|_{\text{mca}} = \frac{\Sigma}{P}$$

$$P = 1806 \text{ l. Poc}$$

$$806 = \frac{20.375}{-2.217} = -9.18$$

$$P = 9.18 \cdot 20 \quad P = 183.768$$

$$|AB|_{\text{mca}} = \frac{4 \cdot 10^{-6}}{183.76}$$

$$|AB|_{\text{mca}} = 21.77 \cdot 10^{-6} \text{ m}$$

$$77/ A = \frac{1}{OPR} - \frac{1}{OPL} \quad \text{ou bien} \quad A = \frac{1}{OPR_c} - \frac{1}{OPL_c}$$

$$OPR_c = -\infty \rightarrow A = -\frac{1}{OPL_c} \rightarrow OPL_c = -\frac{1}{A}$$

$$\rightarrow OPL_c = -23,8 \text{ cm} \rightarrow d = 23,8 \text{ cm}$$

$$78/ C_{m2} = 62,58$$

$$C_{m2} = \frac{1}{OT} - \frac{1}{OPR} \rightarrow \frac{1}{OPR} = \frac{1}{OT} - C_{m2}$$

$$\frac{1}{OPR} = \frac{1}{17 \cdot 10^{-3}} - 62,5 \rightarrow OPR = -27,2 \text{ cm}$$


$$79/ A = \frac{1}{OPR} - \frac{1}{OPL} \rightarrow \frac{1}{OPL} = \frac{1}{OPR} - A$$

$$\frac{1}{OPL} = \frac{1}{-27,2 \cdot 10^{-2}} - 4,2 \rightarrow OPL = -0,127 \text{ m}$$

$$OPL = -12,7 \text{ cm}$$

$$80/ C = \frac{1}{OPR} - \frac{1}{OPR_c} \quad C = \frac{1}{OPR} \quad C = -3,68$$

81/



$$O_1 F_1' = 4 \text{ mm} \quad O_2 F_2' = ?$$

$$O_1 O_2 = 184 \text{ mm}$$

Exercice 81

La Puissance de l'oculaire est égale à la Puissance convergente $\rightarrow P_c = P_{oc} = C_{oc} (1 - \frac{a}{d})$

comme ~~$P_{oc} = C_{oc}$~~ $P_c = C_{oc}$

$$P_{oc} = C_{oc} = \frac{1}{0,02 F_2}$$


Comme $P_{oc} = P_c$, donc l'image $A'B'$ est sur F_2'
on cherche sa position par rapport à O_1 .

$AB \xrightarrow{O_1} A'B'$

$$A \xrightarrow[O_1 F_1']{O_1} A' \quad \frac{1}{O_1 A'} - \frac{1}{O_1 A} = \frac{1}{O_1 F_1'}$$

$$\frac{1}{O_1 A'} = \frac{1}{O_1 F_1'} + \frac{1}{O_1 A} \rightarrow \frac{1}{O_1 A'} = \frac{1}{4} + \frac{1}{-4,1}$$

$$\rightarrow O_1 A = 164 \text{ mm} \rightarrow |O_2 F_2| = 184 - 164 \quad |O_2 F_2| = 20 \text{ mm}$$



$$P_{oc} = \frac{1}{0,02 F_2} \quad P_{oc} = \frac{1}{20 \cdot 10^{-3}} \quad P_{oc} = 50 \text{ D}$$

82/ vision sans accommodation + œil emmétrope
donc l'image finale $A'B'$ est à l'infini.

$$\rightarrow P = P_c = \Delta \cdot C_{ob} \cdot C_{oc} \quad \Delta = O_1 O_2 - O_1 F_1' - O_2 F_2'$$


$$P = 0,16 \times \frac{1}{0,004} \times \frac{1}{0,02} \quad P = 2000 \text{ D} \quad \Delta = 184 - 4 - 20 = 160 \text{ mm}$$

23

83/ L'image finale étant toujours à l'infini (non pas accommodation) $\rightarrow l = l_c$.

$$l = 2000 \text{ cm}$$

84/



L'image finale $A'B'$ doit être rapprochée donc l'image intermédiaire A_1B_1 doit être après f_2 par suite il faut rapprocher l'oculaire de l'objectif.

85/ Il faut chercher la position de A_1B_1 par rapport à O_2

$$AB \xrightarrow{O_1} A_1B_1 \xrightarrow{O_2} A'B' \quad (O_2R)$$

$$A_1B_1 \xrightarrow{O_2} A'B'$$


$$A_1 \xrightarrow{O_2} A' \quad \frac{1}{O_2A'} - \frac{1}{O_2A_1} = \frac{1}{O_2F_2'}$$

$$\frac{1}{O_2A_1} = \frac{1}{O_2A'} - \frac{1}{O_2F_2'} \quad \rightarrow \frac{1}{O_2A_1} = \frac{1}{-30} - \frac{1}{2}$$

$$O_2A_1 = -1,875 \text{ cm} \quad O_2A_1 = -18,75 \text{ mm.}$$

24

suite 85



la nouvelle distance qui sépare l'objet
de l'oculaire est $(O_1 O_2)' = 164 + 18,75$

$$(O_1 O_2)' = 182,75$$

$$\text{déplacement} = (O_1 O_2) - (O_1 O_2)'$$

$$d = 184 - 182,75 \quad d = 1,25 \text{ mm}$$

ou bien pour une image au RK l'image $A_1 B_1$
était à 20 mm, pour une image au RK elle est
à 18,75 donc le déplacement est

$$d = 20 - 18,75$$

$$d = 1,25 \text{ mm.}$$

$$86/ \quad P = \gamma_{ob} \cdot P_{oc}$$

$$\gamma_{ob} = \frac{O_1 A_1}{O_1 A} \quad \gamma_{ob} = \frac{164}{-4,1} \quad \gamma_{ob} = -40$$

$$P_{oc} = C_{oc} \left[1 - \frac{a}{\alpha} \right] \text{ oeil sur } F_2' \rightarrow P_{oc} = C_{oc} = 508$$

$$P = 1401 \times 50 \quad P = 2000 \text{ S}$$

$$87/ \quad G = P \times |O P P|$$


$$G = 2000 \cdot 0,321 \quad G = 640$$

25

$$88/ \quad p = \frac{E}{|AB|_{\text{acc}}} \rightarrow |AB|_{\text{acc}} = \frac{E}{p}$$

$$|AB|_{\text{acc}} = \frac{4 \cdot 10^{-3}}{2000} \quad |AB|_{\text{acc}} = 2 \cdot 10^{-6} \text{ m} \quad |AB| = 2 \text{ mm}$$


89/




$$E = \frac{\Delta}{\omega} \rightarrow \Delta = E \cdot \omega \quad \Delta = 4 \cdot 10^{-3} \cdot 32 \cdot 10^{-2}$$

$$\Delta = 128 \cdot 10^{-5} \text{ m} \quad \Delta = 128 \cdot 10^{-2} \text{ mm} \quad \Delta = 1,28 \text{ mm}$$

90/



Méthode directe



$$\angle_T = 180 - 2 \times 60$$

$$\angle_T = 60^\circ$$

Q1/ $OPR = 1,5m$ $A = 48$

$$A = \frac{1}{OPR} - \frac{1}{OPL} \rightarrow \frac{1}{OPL} = \frac{1}{OPR} - A$$

$$\frac{1}{OPL} = \frac{1}{1,5} - 4 \quad OPL = -0,30m$$

$OPL = 30cm$ en avant de l'œil

Q2/ $C = \frac{1}{OPR} - \frac{1}{OPR_c}$ $OPR_c = 0$

$$C = \frac{1}{1,5} \rightarrow C = 0,678$$

$$C = \frac{1}{OPL} - \frac{1}{OPL_c} \rightarrow \frac{1}{OPL_c} = \frac{1}{OPL} - C$$

$$\frac{1}{OPL_c} = \frac{1}{-0,30} - 0,67 \rightarrow OPL_c = -0,25m$$

$[-0,25m]$

Q3/ $C = \frac{1}{O_1PR} - \frac{1}{O_1PR_c}$ $O_1PR_c = -\infty$

$$C = \frac{1}{O_1PR}$$



OPL
 $(-30cm)$

$$C = \frac{1}{1,52} \quad C = 0,6588$$

$$C = \frac{1}{O_1PL} - \frac{1}{O_1PL_c} \rightarrow \frac{1}{O_1PL_c} = \frac{1}{O_1PL} - C$$

$$\frac{1}{O_1PL_c} = \frac{1}{-0,28} - 0,658 \quad O_1PL_c = -23,64cm$$


$[-0,28] \quad [-\infty, -23,64]$



$$\frac{OPL}{(1,5m)}$$

94/ $\Rightarrow OPR = -40 \text{ cm} \rightarrow \text{Dyope}$

95/ $P = \frac{1}{OPR} \quad P' = -2,58$



$$C = \frac{1}{O_1PR} - \frac{1}{O_1PR_c} \quad O_1PR_c = -\infty$$

$$C = \frac{1}{O_1PR} \quad C = \frac{1}{-38 \cdot 10^{-2}} \quad C = -2,638$$


97/ $C' = \frac{1}{OPR} - \frac{1}{OPR_c} \quad OPR_c = \infty$

$$C' = \frac{1}{OPR} \quad C' = \frac{1}{-0,1} \quad C' = -2,58$$

donc la vergence \downarrow

98/ $a = 0$

$$d = (O_1F')^2 \left[\frac{1}{OPR} + \frac{1}{O_2R} + a \right] \quad (-75 \text{ cm}) \quad (-12 \text{ cm})$$




$$C = \frac{1}{O_1F'} = \left(\frac{n}{n_0} - 1 \right) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

$$\rightarrow C = 108 \rightarrow O_1F' = 0,1 \text{ m}$$

$$d = (0,1)^2 \left[\frac{1}{-0,75 + 0} - \frac{1}{-0,15 + 0} \right]$$

$$d = 0,07 \text{ m} \quad d = 7 \text{ cm}$$



28

$$99/ \quad P = c \left(1 - \frac{a}{d}\right) \quad a=0 \quad P=c=108$$

$$100/ \quad G = P \times |0.22| \quad G = 10 \times 0,12 \\ G = 1,2$$


$$101/ \quad G' = P \times |0.22|$$

$$G' = 10 \times 0,25 \quad G' = 2,5$$

↳ *grossissement plus important*

102/

réfracte + réfléch.



$$103/ \quad OA \text{ réel} \rightarrow OA = -15 \text{ cm}$$


$$OA' \text{ réelle} \rightarrow OA' > 0 \quad OA' = 12 \text{ cm}$$

$$\frac{1}{OF'} = \frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA} \rightarrow \frac{1}{OF'} = \frac{1}{12} - \frac{1}{-15}$$

$$OF' = 6,67 \text{ cm.}$$

$$104/ \quad \gamma = \frac{OA'}{OA} \quad \gamma = \frac{12}{-15} \quad \gamma = -0,8$$

105/



$$A'B' \xrightarrow{O_2} A''B''$$

$$A''B'' \text{ droite} \rightarrow \delta > 0 \rightarrow O_2 A'' < 0$$

$$|A''B''| = 4 \text{ cm} \quad O_2 A' = -1 \text{ cm}$$

$$O_2 A'' = -10 \text{ cm}$$

$$A' \xrightarrow{O_2} A''$$

$$O_2 F_2$$

$$\frac{1}{O_2 F_2} = \frac{1}{O_2 A''} - \frac{1}{O_2 A'} \rightarrow \frac{1}{O_2 F_2} = \frac{1}{-10} - \frac{1}{-1}$$

$$\rightarrow O_2 F_2 = 1,1 \text{ cm}$$

$$106/ \quad | \delta_2 | = \frac{|A''B''|}{|A'B'|} \rightarrow |A'B'| = \frac{|A''B''|}{| \delta_2 |}$$

$$\delta_2 = \frac{O_2 A''}{O_2 A'} \quad \delta_2 = \frac{-10}{-1} \quad \delta_2 = 10 \quad |A'B'| = \frac{4}{10}$$

$$|A'B'| = 0,4 \text{ cm}$$

$$| \delta_{11} | = \frac{|A'B'|}{|AB|} \rightarrow |AB| = \frac{|A'B'|}{| \delta_{11} |}$$

$$|AB| = \frac{0,4}{0,8} \quad |AB| = 0,5 \text{ cm}$$

$$d = 0,5 \text{ cm}$$

30